

BOLETIN DE AVISOS

[SEPTIEMBRE 2018]

TRATAMIENTO DE OTOÑO EN OLIVAR.

MOSCA DEL OLIVO.

La mosca del olivo es la principal plaga que afecta al olivar en Castilla La Mancha. Ataca exclusivamente al fruto provocando daños que afectan tanto a la cantidad, generando una pérdida de peso y rendimiento al comerse la larva la pulpa y por la caída prematura del fruto por las galerías que afectan al tejido que sujeta la aceituna al cabillo, como por la pérdida de calidad de los aceites obtenidos por un aumento de la acidez.



Imagen 1. Izquierda, Hembra adulta de mosca. Derecha, Macho adulto de mosca.



Imagen 2. Aceitunas picadas con orificio de salida.

Si observa signos de picada, pregunte a los técnicos del departamento sobre la incidencia de mosca en su zona a la hora de realizar el tratamiento.

Tipos de tratamientos para el control de la mosca del olivo:

- Tratamientos por parcheo (tratamiento cebo): método para el control de adultos que evita que la aceituna sea picada. Se debe tratar 1-2 m² de la copa de cada olivo orientada al sur con una mezcla de un insecticida más un atrayente (proteína hidrolizada) con aproximadamente unos 200 cc de caldo por olivo.
- Tratamientos en pulverización total (tratamiento larvicida) a la copa del olivo, utilizando un insecticida autorizado. Se realizará en caso que los frutos picados por mosca superen el 5-7%.

Desde el Departamento Técnico del Grupo le hacemos la siguiente propuesta de tratamiento de otoño para olivar:

PRODUCTO	MARCA	MATERIA ACTIVA	DOSIS	ECOLOGICO
INSECTICIDA (MOSCA)	PERFEKTHION TOP	Dimetoato 40%	100 cc/HI	NO
	SPRINTOR CEBO	Spinosad 0,024%	**	SI
FUNGICIDA	COVINEX 700 FLOW	Oxicloruro de Cobre 20%	200 cc/HI	SI
	COVINEX PM	Oxicloruro de Cobre 11% + Sulfato Cuprocálcico 10%	400-700 gr/HI	NO
ABONO FOLIAR	FORTAN	Potasa sólida quelada con magnesio y oligoelementos	250-500 g/HI	NO
	POTASIOTEX	Corrector potásico 5-0-50	250-500 cc/HI	SI
AMINOACIDOS	VEPRO	Abono con aminoácidos	250-300 cc/HI	SI
	AHP MINO-24	24% Aminoácidos libres	100-200 cc/HI	SI
MOJANTE	MOJANTE QUIMUR	Alquil Poliglicol 20%	50 cc/HI	NO

Nota: Se recomienda al agricultor cambiar la materia activa del insecticida empleado en primavera.

** Dosis Sprintor Cebo: Parcheo (aplicación terrestre), 1 l/Ha. Pulverizar utilizando entre 5 y 10 l. de caldo/ Ha. Puede realizarse el tratamiento concentrando la aplicación en el 25 o el 50%, de la superficie a proteger (Una fila de cada cuatro ó una de cada dos. Bandas (aplicación aérea), 0,25- 0,5 l/Ha.. Pulverizar utilizando entre 2,5 l. de caldo/Ha., tratando en bandas el 25% de la superficie a proteger.

El grupo Montes Norte también ofrece al agricultor la posibilidad de adquirir estos tratamientos ya preparados en lotes correspondientes a cada tratamiento, en los que se incluye un fungicida, un abono foliar y estimulantes para el desarrollo de la planta.

CONSULTE DISPONIBILIDAD DE LOS PRODUCTOS EN SU TIENDA COOPERATIVA.